



FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

La culture d'OIGNON


ITCMI 2010

	البصل	
	OIGNON	
	ONION	
Nom botanique		<i>Allium cepa</i>
Famille:		<i>Alliacées</i>
Espèce originaire d'Asie Centrale. Cultivée par les Egyptiens il y a 5000 ans.		

I - PLANTE

- Nombre de graines au gramme : 250 à 300.
- Température de germination optimum : 24°C
- Longévité moyenne de la graine : 2 à 4 ans
- Quantité de semence nécessaire pour 1 ha:
 - Semis direct : 4 à 7 kg.
 - Plantation d'oignon en bulbes : 7,5 à 8 qx / ha.
- Plante bisannuelle : 1^{ère} année formation des bulbes.
 - 2^{ème} année floraison et production de graines
- Cycle végétatif : 85 à 120 jours.

II - STADES PHENOLOGIQUES



- 09 : levée.
- 011 : stade crochet.
- 012 : stade flagelle.
- 11 : première feuille étalée.
- 15 : développement des feuilles.
- 41 : développement des racines et tiges.
- 49 : maturation des bulbes.
- 51 : pousse principale commence à sortir.
- 55 : apparition des premières fleurs.
- 61 : début de la floraison.
- 75 : maturation des graines.

III - VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

Jaune paille de vertus, Jaune de valence, jaune d'Espagne, Rouge d'amposta, de Barletta...

IV – EXIGENCES

- Aime les sols sablo- argileux ou argilo- sableux se ressuyant bien.
- Température optimale 15°C plus active entre 18°C à 23 °C.
- L'oignon est très exigeant en lumière, les jours courts compromettent la formation des bulbes.
- pH : craint les sols acides
- Salinité : moyennement tolérant 1,9 à 3,2 g/l (3 à 5 mmhos / cm⁻¹)

V- ZONES DE PRODUCTION

Mascara, Skikda, Boumerdes, Blida

VI- MISE EN PLACE DE LA CULTURE

- Labour 15 à 20 cm
- Disquage + hersage.

6.1- Semis – Plantation

Deux méthodes de production de l'oignon:

6.1.1 - Semis en pépinière

- Quantité de semence : 4 à 7 kg / ha
- Epoque de semis : mi août -septembre.- octobre
- Plantation : densité de repiquage : 40 à 50 pieds / m²
- Distances 0,20 m x 0, 10 m.

6.1.2 - Plantation en bulbes secs de consommation

- Plantation en bilbules (6 à30 mm de diamètre)
- Densité : 9 à 12 bilbules / mètre linéaire
soit 7,5 à 8 qx / ha
- Epoque de plantation : août – septembre.

6.2- ENTRETIEN DE LA CULTURE

Binage, désherbage

6.3 - Fertilisation

Eviter apport de fumier frais

Fumure minérale de fond


60 à 80 unités de N / ha
100 à 120 unités de P / ha
180 à 200 unités de K / ha

Fumure d'entretien

45 unités de N / ha
50 unités de K / ha

6.4 - Irrigation

Peut se cultiver en sec partout où la pluviométrie est supérieure à 400 mm entre décembre et fin avril.



VII - PROTECTOIN SANITAIRE



Mildiou ↑



mouche de
L'oignon ↑



↑
Rouille



↑
Botrytis

Rouille: Mancozebe 80 % wg

Mouche: Phytosol G5

Mildiou: Mancozebe + Metalaxyl WP

Botrytis: Benomyl

VIII - RECOLTE ET CONSERVATION

8.1- Récolte

- L'oignon en vert : récolte fin mars à mai
- L'oignon production bulbille : mai
- L'oignon consommation et de conserve :
juillet- août - septembre
- L'oignon en bulbes récolté doit séjourner
quelque jours au champ pour le séchage



8.2 - Conservation

Avant la conservation procéder au séchage par soufflerie d'air 60°C puis 35°C pendant 20 à 30 heures .Le séchage peut se réaliser dans des locaux à température voisine 0°C et 75%d'humidité relative avec circulation d'air maximum.Néanmoins, les meilleures conditions de stockage sont de 3 à 0°C avec une hygrométrie de 65 %.

Les oignons de couleur se conservent mieux que les oignons blancs.

Pour améliorer la conservation : traiter à l'oxychlorure de cuivre 5 kg / ha 15 jours avant la récolte.

Rendements : 25 à 50 t / ha.

FTV : LA CULTURE DE L'OIGNON (1 HA)
200 QX/HA

Opérations	Main d'œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre jours	Coût unitaire	Montant DA	Nbre heure	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I- Pépinière										
- Préparation + terreau (confection planches +entretien)	3	600	1800	-	-	-	-	-		1800
- Film plastique	-	-		-	-	-	60m2	15	900	900
- Semence	-	-		-	-	-	7 kg	1000	7000	7000
- Terreau	-	-		-	-	-	7 m3	1200	8400	8400
S/T	3	-	1800	-	-	-	-	-	16300	18100
II- Préparation du sol										
- Epanchage	0,5	600	300	4	500	2000	8 qx	6000	48000	50300
- Labour	1	600	600	8	500	4000	-	-		4600
- Disquage+hersage	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
S/T	2	-	1200	16	-	8000	-	-	48000	57200
III- Plantation et entretien:										
- Confection planches semis	10	600	6000	-	-		-	-		6000
- Plantation	15	600	9000	-	-		-	-		9000
- Entretien: binage+désherbage	15	600	9000	-	-		-	-		9000
- Irrigation	10	600	6000	-	-		4000 m3	4	16000	22000
- Traitement phyto : fong+insect	8	600	4800	32	500	16000		-	15000	35800
- Fumure entretien	0,5	600	300	-	-		1 ql d’N	6000	6000	6300
S/T	58,5	-	35100	32	-	16000	-	-	43000	94100
V- Récolte et transport :										
- Récolte	20	600	12000	-	-		-	-		12000
- Stockage + conditionnement	10	600	6000	-	-		-	-		6000
- Transport	4	600	2400	16	500	8000	-	-		10400
S/T	34	-	20400	16	-	8000	-	-		28400
Total Général	97,5	-	58500	64	-	32000	-	-	107300	197800